

Výskyt spály v kolektivu žáků 1. stupně.

Vážení rodiče informujeme Vás tímto, že v kolektivu žáků 1. stupně se vyskytla spála.

Tato situace byla dnes 2. 3. 2023 konzultována s KHS Plzeň. Probíhá zvýšená dezinfekce tříd.

Škola se z tohoto důvodu neuzavírá. Rodiče sledujte příznaky u svých dětí, více informací viz níže.

Spála Spála (scarlatina) je bakteriální infekční onemocnění, které nejčastěji manifestuje na jaře a na podzim a objevuje se obvykle u dětí do 10 let věku. Původcem onemocnění je bakterie Streptococcus pyogenes. Spála se přenáší nejčastěji kapénkami, tedy vzduchem, nebo přímo přes poraněnou kůži, tzv. ranná spála (je vzácnější). Inkubační doba spály je 2–5 dnů, u přenosu přes poraněnou kůži 12 hodin. 10 Čím je spála závažná? Hlavně tím, že jí lze onemocnět kdykoli znovu. Pročesané onemocnění nezanechává žádnou imunitu. Někteří jedinci jsou pouze nosiči bakterie způsobující spálu, ale sami jsou bez příznaků onemocnění. Mohou proto snadno nakazit ostatní v kolektivu. PROTO JE NUTNÉ, ABY RODIČE OZNÁMILI ŠKOLCE/ŠKOLE SPÁLU I V PŘÍPADĚ, ŽE SPÁLOU ONEMOCNÍ SOUROZENEK DÍTĚTE, KTERÉ JE VE ŠKOLCE/ŠKOLE A PROZATÍM NEVYKAZUJE ZNÁMKY NEMOCI! Lékař u dítěte se spálou nařizuje izolaci, která trvá po celou dobu onemocnění. Příznaky spály: - Na počátku se objevuje horečka a nastupuje narůstající bolest v krku. - Dítě může mít potíže s polykáním. - Občas se objevuje bolest břicha a zvracení. - Jazyk dítěte je bíle povleklý, posléze se začne od špičky olupovat, až má „malinovou“ barvu. - V podpaží, v třísech, v loketních jamkách, v podbřišku se objevuje drobná červená vyrážka. Spála se léčí výhradně antibiotiky! Dítě může do kolektivu až po ukončené léčbě a nejlépe po rekonvalescenci, kterou určí lékař.

ZDROJ: [ODKAZ NA ZDROJ ZDE](#)

Děkuji

Mgr. Milena Raková
ředitelka školy ZŠ a MŠ Radnice, p. o.

